

مطالعه اثر تزریق داخل صفاقي نالوکسان بر عوامل موثر بر گیرنده $GABA_B$ متابوتروپیک در هسته میخی شکل

مزانسفال (Cnf) موش صحرایی

مرتضی بخشش^{۱*}، مظفر رضوانی پور^۲، وحید شیبانی^۳

تاریخ دریافت: ۸۵/۷/۲۵

تاریخ پذیرش: ۸۵/۱۱/۱۰

چکیده

مقدمه: شواهدی در دست است که نشان می‌دهد هسته میخی شکل پلی-مزانسفال در انتقال درد نقش دارد. این پژوهش در راستای بررسی نقش تعدیل انتقال درد محیطی از طریق نخاع به سمت مراکز بالاتر عصبی انجام گرفت. **مواد و روشها:** در این تحقیق تاثیر تزریق داخل صفاقي نالوکسان بر اثرات ناشی از تزریق میکرونی مورفین و آگونیست گیرنده گابا نوع B (-)-باکلوفن و آنتاگونیست آن (CGP₃₅₃₄₈) در موش صحرایی بررسی شد. **یافته های پژوهش:** تزریق میکرونی مورفین ($10 \mu g/0.5 \mu l/rat$) یا دوزهای متفاوت با کلوفن ($1 \mu g/rat$ و 0.5 و 0.25) اثرات ضد دردی بارزی را در دو فاز حاد و مزمن آزمون بدنبال داشت. کاهش پاسخ ضد دردی که با تزریق مورفین یا با کلوفن در دو فاز ایجاد شد، بوسیله تزریق CGP₃₅₃₄₈ کاهش نشان داد. پاسخ به درد ناشی از تزریق میکرونی مرکب از باکلوفن (بالاترین دوز $1 \mu g/rat$) و تزریق داخل صفاقي (i.p) نالوکسان در هر دو فاز در مقایسه با گروه سالیन یا گروه باکلوفن به تنهایی کاهش نشان داد. تزریق میکرونی CGP₃₅₃₄₈ به تنهایی در فاز حاد آزمون فرمالین، اثرات ضد دردی داشت و ترکیب مورفین با دوزهای مختلف با کلوفن، موجب تقویت پاسخ ناشی از با کلوفن نشد، در حالیکه ترکیب مورفین با CGP₃₅₃₄₈ موجب تقویت پاسخ ضد دردی در فاز حاد شد. **نتیجه گیری نهایی:** می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که گیرنده های $GABA_B$ موجود در هسته میخی شکل از طریق گیرنده های مخدری اثرات ضد دردی خود را در آزمون فرمالین اعمال کرده اند.

واژه های کلیدی: نالوکسان، گیرنده $GABA_B$ ، هسته میخی شکل

Email: bakhshesh.m@gmail.com

۱- مربی و عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۲- استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳- استادیار فیزیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه

درد ناشی از التهاب یا آسیب اعصاب محیطی یک وضعیت ناراحت‌کننده و بعضاً ناتوان‌کننده است. خوشبختانه سیستم‌های کنترل کننده نزولی درد که از قسمت شکمی بصل النخاع (RVM)، هسته دامه بزرگ (NRM)، هسته رافه پشتی (NRD)، هسته ماگنوسلولار (NMC) و ماده خاکستری دورقناتی (PAG) سرچشمه می‌گیرند، نقش مهمی موثری بر انتقال درد دارند (۱).

تزریق موضعی داروها، ضایعات تروماتیک ناحیه‌ای و یا تحریک الکتریکی این مناطق نقش فعال ضد دردی آنها را آشکار نموده است. علاوه بر مهار داخل نخاعی یا سگمنتال درد، در بین سیستم‌های کنترل‌کننده فوق نخاعی، RVM نقش کلیدی در سرکوب درد دارد (۲).

هسته میخی شکل (Cnf) یک ساختار مشبک در مغز میانی است که از بخش منقاری پل مغز تا قسمت پره نکتال تالاموس امتداد دارد (۳). این هسته در نزدیکی PAG است و ارتباطات وسیعی با سیستم نزولی درد دارد که عمدتاً ورودی و خروجی‌های گابا ارژیک و کولینرژیک با RVM، NRM و PAG برقرار می‌کند (۴).

تحریک الکتریکی هسته میخی شکل در حین انجام آزمایشات رفتاری درد، موجب افزایش دوره زمانی (Tail- flick) آزمون پرش دم شده است (۵). به طوریکه این اثر ضد دردی بوسیله نالوکسان (آنتاگونیست عمومی مخدرها) و اسکوپولامین (آنتاگونیست موسکارینی کولینرژیک) قابل برگشت بوده است (۳و۶).

تخریب مراکز ضد دردی و فیبرهای نزولی کنترل درد، موجب کاهش اثر ضد دردی ناشی از مخدرها می‌شود (۷). گابا سه نوع گیرنده شناخته شده دارد. گیرنده‌های GABA در سیستم ضد دردی عملکرد شناخته شده‌ای دارند (۸ و ۹). از آنجا که وجود گیرنده‌های گابا A و B در هسته میخی ثابت شده است و گیرنده متابوتروپیک گابا B به دو صورت پیش سیناپسی و پس سیناپسی اثرات هیپرپلاریزه کننده و

مهمی دارد، لذا هدف از این پژوهش ابتدا به بررسی نقش این گیرنده اختصاص یافت.

احتمال دخالت سیستم مخدری و تداخل عملکردی آن با عوامل موثر بر گیرنده گابا در هسته میخی شکل مطالعه نشده است و تقویت اثر ضد دردی سیستمیک مرفین بوسیله اثرات گابا ارژیک در جوندگان منجر به این نتیجه‌گیری شده است که سیستم‌های مخدری و گابا ارژیک بطور جداگانه عمل می‌کنند ولی اثرات آنها در مسیرهای نزولی همگرا می‌شود (۱۰، ۱۱ و ۱۲). تفاوت عملکردی بین مخدرها و گابا، به ناحیه مورد مطالعه بستگی دارد مثلاً بی‌دردی ناشی از گابا به نالوکسان حساسیتی ندارد ولی آگونیست‌های گابا و مهارکننده‌های گابا ترانس آمیناز موجب افزایش بی‌دردی ناشی از مخدرها می‌شوند (۱۳).

مواد و روش‌ها

نمونه مورد مطالعه: در این پژوهش از ۱۵۴ موش صحرایی نر از نژاد NMRI، با وزن تقریبی بین ۲۵۰-۳۱۰ gr در تمام آزمایشات استفاده شد. حیوانات در گروه‌های هشت تایی در شرایط کنترل ثابت حرارت ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) و نور نگهداری شدند. حیوانات به جز موقع آزمایش در دسترسی به آب و غذا هیچ محدودیتی نداشتند.

داروها و مواد: موادی که استفاده شد عبارت بودند از: نالوکسان (آلفاسان - هلند)، (-) باکلوفن (۱۴) و CGP₃₅₃₄₈ (سیگما- آلمان) به ترتیب به عنوان آگونیست و آنتاگونیست گیرنده GABA_B، مورفین (تولید دارو- ایران)، زایلازین (آلفاسان - هلند)، کتامین هیدروکلراید (روتکس مدیا- هلند).

باکلوفن (۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ میکروگرم در ۰/۵ میکرولیتر)، CGP₃₅₃₄₈ (۲/۵، ۵ و ۱۰ میکروگرم در ۰/۵ میکرولیتر) و مورفین (۱۰ میکروگرم در ۰/۵ میکرولیتر) در سالین حل شدند و در هر روز محلول‌های جدیدی از آنها در حجم ۰/۵ میکرولیتر در مدت زمان یک دقیقه با تکنیک پیش راندن حباب،

شد. هر مقدار عددی از نمودارها بیانگر میانگین $\pm$ SEM در تعداد هشت عدد موش می باشد.


یافته های پژوهش

در این پژوهش تعداد ۱۵۴ موش صحرایی نر از نژاد N-MRI برای آزمایشات در نظر گرفته شد و داروهای مورد نظر در دوز های تعیین شده تزریق شدند.

اثر نالوکسان بر تاثیر ضد دردی ناشی از

تزریق آگونیست گیرنده گابا B:

مقایسه بین گروه باکلوفن و نالوکسان (۲mg/kg) و گروه باکلوفن به تنهایی با کمال تعجب، اختلاف ضد دردی معنی داری را برای نالوکسان نشان داد و این پاسخ در هر دو فاز حاد و مزمن آزمون فرمالین مشاهده می شود ($P < 0.001$) ($F(28) = 0.004$) (شکل-۱).



شکل ۱: مقایسه میانگین مدت زمان پاسخ به درد گروه سالین با تزریق باکلوفن با دوز ۱ میکروگرم، ۱۰ دقیقه پس از تزریق داخل صفاقی نالوکسان در هر دو مرحله حاد و مزمن به طور معنی داری کمتر از گروه سالین می باشد ($P < 0.001$).

به درد در اثر تزریق فرمالین ۵% به داخل پنجه پای عقبی سمت چپ حیوان شد که این کاهش در هر دو فاز حاد و مزمن مشاهده شد. در مقایسه با گروه سالین و شم جراحی، این کاهش کاملاً معنی دار بود ($P < 0.01$) ($F(30) = 41.38$) (جدول شماره ۱).

بوسیله پمپ انفوزیون (Stoelting- USA) در مختصات $AP = +0.28mm$ نسبت به خط اینتر اورال (IA)، $LP = 1/4mm$ و $DV = 6mm$ تزریق می شد و سوزن تزریق به مدت یک دقیقه در محل هسته باقی می ماند. پس از فیکساسیون، برش های کرونال به ضخامت $150 \mu m$ تهیه و روی لام ژلاتینه فیکس شده و با روش رنگ آمیزی نیسل، رنگ آمیزی و تائید می شدند.

آنالیز آماری: مقایسه بین گروهها بوسیله آزمون t

دو دامنه انجام شد و بسته به برابری یا نابرابری واریانسها، ANOVA و آزمون Dunnet post hoc برای بررسی داده ها در گروهها استفاده شد. اختلاف بین میانگین ها در صورت $P < 0.05$ معنی دار تلقی

تزریق میکرونی مورفین یا آگونیست گیرنده گابا B:

آنالیز داده ها با آزمون t دو دامنه نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه سالین و گروه شم جراحی وجود ندارد ($P = 0.1$) ($F(30) = 0.42$).

(جدول ۱). تزریق مورفین ($10 \mu g / 0.5 \mu l$) در داخل هسته موجب کاهش شدید مجموع زمان پاسخ


جدول ۱: خلاصه نتایج به دست آمده از تزریق میکرونی سالین، مورفین، باکلوفن و تزریق داخل صفاقي نالوکسان

گروهها	فاز حاد	فاز مزمن
سالین	$61/56 \pm 3/04$	$127 \pm 5/56$
شم جراحی	$57/18 \pm 3/25$	$116/81 \pm 3/08$
مورفین $10 \mu\text{g}/\text{rat}$	$35/62 \pm 1/41^{***}$	$51/81 \pm 4/85^{***}$
باکلوفن $1 \mu\text{g}/\text{rat}$	$26/81 \pm 2/1^{***}$	$25/43 \pm 2/9^{***}$
باکلوفن $0/5 \mu\text{g}/\text{rat}$	$33/25 \pm 1/48^{***}$	$40/68 \pm 2/41^{***}$
باکلوفن $0/25 \mu\text{g}/\text{rat}$	$52/5 \pm 3/79$	$97 \pm 12/8^{**}$
باکلوفن $1 \mu\text{g}/\text{rat}$ + $2 \text{ mg}/\text{kg}$ نالوکسان	$2/42 \pm 0/89^{***} \star$	$10 \pm 1/85^{***} \star$

حیوانات با سالین (۰/۵ میکرولیتر)، با کلوفن (۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ میکروگرم) و باکلوفن $1 \mu\text{g}$ همراه یا بدون تزریق نالوکسان $2 \text{ mg}/\text{kg}$ مورد مطالعه قرار گرفتند ($p < 0/01$) **. ($p < 0/001$) *** می باشد. :
 $\star$ مقایسه بین گروه باکلوفن + نالوکسان با گروه باکلوفن.

تایید شد که دارو موجب اثرات کاهشی وابسته به دوز شده است.
 $[F(3 \text{ و } 28) = 43/64 (p < 0/01)]$. بطوریکه
 بیشترین پاسخ ضددردی در بالاترین دوز مشاهده می شود.

تزریق میکرونی دوزهای مختلف باکلوفن (۰/۲۵، ۰/۵، و ۱ میکروگرم) در داخل هسته میخی شکل، موجب کاهش شدید پاسخ به درد شد (شکل ۱). بی دردی ناشی از باکلوفن همانند مورفین در هر دو فاز آزمون فرمالین مشاهده شد. با استفاده از ANOVA




شکل ۱. اثرات ضد دردی دوزهای مختلف باکلوفن در فاز اول (۵-۰ دقیقه) و فاز دوم (۴۵-۱۵ دقیقه) آزمون فرمالین. مجموع زمان پاسخ به درد لیسیدن و گازگرفتن پنجه پای تزریق شده در زمان آزمون ثبت شده است. هر مقدار نشان داده شده برابر با میانگین $\pm$ SEM زمان ثبت شده در تعداد ۸ عدد موش می باشد $p < 0.01$ و $p < 0.001$.

تزریق میکرونی آنتاگونیست گیرنده گابا B:

۲۸۶ = $F(3, 28)$. آنالیز داده های مربوط به CGP_{35348} در حضور مورفین نشان داد که این دارو در دوزهای کم اثرات ضددردی مورفین را تشدید کرده است $[P < 0.01]$ (۵۰/۶۶۲ = $F(3, 28)$ و $F(3)$ (نمودار ۲)).

تزریق CGP_{35348} فقط در فاز مزمن موجب افزایش پاسخ به درد به صورت وابسته به دوز شد، ولی این اختلاف فقط در حضور بالاترین دوز (۱۰ میکروگرم) معنی دار شده است $[P < 0.05]$.




نمودار ۲: اثر ناشی از دوزهای مختلف CGP₃₅₃₄₈ (۲/۵، ۵ و ۱۰ میکرولیتر) بر اثرات ضد دردی ناشی از تزریق ۱۰ میکروگرم مورفین در فاز حاد (۵-۱۰ دقیقه) و فاز مزمن (۴۵-۱۵ دقیقه) پس از تزریق فرمالین در پنجه پای عقبی حیوان. هر مقدار نشان داده شده برابر است با میانگین $\pm$ SEM زمان ثبت شده در تعداد ۸ عدد موش $P < 0.05$ و $P < 0.001$.

۱۰ میکروگرم CGP₃₅₃₄₈ را دریافت می کردند. آنالیز داده ها بوسیله ANOVA، یک تقابل اثر میان باکلو فن و CGP₃₅₃₄₈ را نشان داد، بطوریکه در بالاترین دوز CGP₃₅₃₄₈، اثرات ضددردی باکلو فن کاملاً از بین رفته است ($P=1/000$) [$F(3 \text{ و } 28)=101/80$].

تزریق میکرونی همزمان آگونیست و آنتاگونیست گیرنده گاباB:

نمودار ۳ اثر تعدیل کنندگی ناشی از تزریق میکرونی CGP₃₅₃₄₈ بر اثر ضددردی ناشی از باکلو فن در هسته میخی شکل را بعد از تزریق فرمالین نشان می دهد. حیوانات قبل از تزریق باکلو فن، دوزهای مختلف ۲/۵، ۵ و



نمودار ۳: مقایسه اثر تعدیل کنندگی ناشی از تزریق میکرونی CGP₃₅₃₄₈ بر اثر ضددردی ناشی از باکلوفن در فاز حاد (۵-۰ دقیقه) و فاز مزمن (۴۵-۱۵ دقیقه) پس از تزریق فرمالین در پنجه پای عقبی حیوان. هر مقدار نشان داده شده برابر است با میانگین $\pm SEM$ زمان ثبت شده در تعداد ۸ عدد موش $P < 0.05$ و $P < 0.001$. ***= $P < 0.001$

بحث و نتیجه گیری

در برخی مطالعات گذشته، نالوکسان موجب کاهش اثر ضد دردی ناشی از بیکوکولین (آنتاگونیست گیرنده GABA_A) تزریق شده به داخل PAG یا تزریق i.t. موسیمول (آگونیست گیرنده GABA_A) و یا تزریق i.c.v. باکلوفن شده است (۱۶ و ۱۸). در تحقیقات دیگر هم ثابت شده است که تزریق میکرونی نالوکسان یا موسیمول بدخل PAG موجب کاهش اثر ضددردی ناشی از مورفین و بیکوکولین شده است (۱۴). تقریباً بطور کلی در آزمونهای حرارتی درد، آگونیستهای GABA_A اثرات ضد دردی مورفین را بلوک می کنند که این اثر بوسیله آنتاگونیستهای GABA_A معکوس می شود (۱۲ و ۱۳).

مکانیسم فوق نخاعی که بواسطه گیرنده های μ موجب اثرات بی دردی مورفین می شود (۱۱). بوسیله فعال شدن گیرنده α_2 آدرنژیکی یا سروتونرژیکی 5HT₃ از طریق مسیر سروتونرژیک

داروهای مخدر و داروهائی که موجب انتقال سیناپسی گابا می شوند، دارای اثرات ضد دردی شناخته شده ای هستند. در این تحقیق تزریق داخل هسته ای مورفین و باکلوفن (به عنوان آگونیست گیرنده GABA_B) موجب ایجاد اثرات ضد دردی شد، به طوری که این پاسخ ضد دردی به ترتیب به میزان ۷۰-۵۰ درصد در هر دو فاز آزمون فرمالین مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان داد تزریق داخل صفاقی نالوکسان موجب تشدید پاسخ ضد درد مرکزی ناشی از باکلوفن در هسته میخی شکل شده است که این کاهش به ترتیب برای فاز حاد و مزمن برابر ۹۵/۲ درصد و ۸۹/۶ درصد می باشد. در اثر تزریق همزمان باکلوفن و CGP₃₅₃₄₈، اثرات ضد دردی باکلوفن در بالاترین دوز CGP₃₅₃₄₈ کاملاً حذف شده است در حالیکه اثرات ناشی از مورفین بخصوص در فاز حاد بوسیله CGP₃₅₃₄₈ تقویت شده است.

نتایج بدست آمده در این پژوهش باشند که نشان دهنده دخالت گیرنده های $GABA_B$ در پاسخ ضد دردی ناشی از باکلوفن می باشد (۹، ۱۷ و ۱۸). به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که خروجی مهاری گابا ارژیکی هسته Cnf، نقش مهمی در تعدیل رفتار پاسخ به درد در موش صحرایی دارد.

سپاسگزاری

صمیمانه از پرسنل و اعضای محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان که هزینه این طرح را متقبل شدند و در انجام آن همکاری نمودند سپاسگزاری میگردد.

اسپاینوپتال اعمال می شود (۱۶). همچنین مکانیسم ضد دردی فوق نخاعی باکلوفن به صورت پیش سیناپسی و پس سیناپسی (۳)، از طریق مهار مسیرهای صعودی و فعال کردن مسیر نزولی نورآدرنژیک (۸) و سروتونرژیک (۱) واسطه گری می شود.

بطور کلی می توان گفت این اختلاف عملکردی داروها و گیرنده ها می تواند مربوط به محل قرارگیری گیرنده در شبکه درهم پیچیده عصبی و تفاوت عملکردی دو سیستم ضد دردی حرارتی و مکانیکی - شیمیایی باشد که موجب بروز چنین حالاتی می شود. مکانیسم نخاعی باکلوفن در ایجاد پاسخ ضددردی، وابسته به مهار فیبرهای آوران اولیه درد است. این اثر با تزریق $i.t$ CGP₃₅₃₄₈ کاملاً خنثی می شود (۳). این نتایج می تواند تایید کننده

References

1. Abellan MT, Jolas T, Aghajanian GK, et al. Dual control of dorsal raphe serotonergic neurons by $GABA_B$ receptors. Electrophysiological and micro dialysis studies. Synapse 2000; 36: 21-34.
2. Abols IA, Basbaum AI. Afferent connections of the rostral medulla of the cat: a neural substrate for midbrain-medullary interactions in the modulation of pain. J Comp Neurol 1991; 201(2): 285-297.
3. Bernard D, Bing Z, Lebares D. Afferents and efferents of the rat cuneiformis nucleus: an anatomical study whit reference to pain transmission- Brain Res 1989; 490(1): 181-185.
4. Bouhasira D, Bing Z, LeBars D. Studies of brain structures involved in diffuse noxious inhibitory controls: the mesencephalon. J Neurophysiol 1990; 64:1712-1723.
5. Chang KM, Kim YH, Song DK, et al. Differential modulation by baclofen on antinociception- induced by morphine and β -endorphin administered intracerebroventricularly in the formalin test. Neuropeptides 1999; 33(6): 534-541.
6. Choi SS, Han KJ, Lee HK, et al. Possible antinociceptive mechanisms of opioid receptor antagonists in the mouse formalin test. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 2003; 75: 447-457.
7. Cutting DA, Forban CC. Alternative approaches to analgesia, baclofen as a model compound. Br Pharmacol 1975; 54: 171-182.
8. Diring DM, Yaksh TL. Intrathecal baclofen & muscimol, but not midazolam, are antinociceptive using the rat-formalin model. J Pharmacol Exp Ther 1995; 275(1): 219-227.

9. Furst S. Transmitter involved in antinociception in the spinal cord. Brain Research Bulletin 1999; 48(2): 129-141.
10. Gilbert AK, Franklin KBJ. GABAergic modulation of descending inhibitory system from the rostral ventromedial medulla (RVM). Dose_response analysis of nociception and neurological deficits 2001; 90:25-36.
11. Green GM, Dickenson A. GABA-receptor control of the amplitude and duration of the neural response to formalin in the rat spinal cord. Eur J Pain 1997; 1(2): 95-104.
12. Hammond DL, Nelson V, Thomas D. Intrathecal methysergide antagonizes the antinociception but not the hyperalgesia produced by injection of baclofen in the ventromedial medulla of the rat. Neuroscience letters 1998; 224(13):93-96.
13. Hardman JE, Limbard EL, Goodman L. et al. The pharmacological basis of therapeutics 10th Ed. New York: Mc Graw-Hill, 2001
14. Heinricher MM, Kaplan HJ. GABA-mediated inhibition in rostral ventromedial medulla: role in nociceptive modulation in the lightly anesthetized rat. Neuroscience 1991; 47: 105-113.
15. Hony Y, Abbott FV. Behavioral effect of intraplantar injection of inflammatory mediators in the rats. Neuroscience 1994; 63: 827-836.
16. Hugel S, Schlichter R. Convergent control of synaptic GABA release from rat dorsal horn neurons by adenosine and GABA autoreceptors. J Physiol 2003; 551: 479-489.
17. Hurley RW, Banfor P, Hammond DL. Spinal pharmacology of antinociception produced by microinjection of μ and δ opioid receptor agonist in the ventromedial medulla of the rat. Neuroscience 2003; 118: 789-796.
18. Levy RA, Proudfit HK. The analgesic action of baclofen. J Pharmacol EXP Ther 1997; 200: 437-442.

Study of the Effect of Intraperitoneal (i.p) Injection of Naloxone on Metabotropic GABA_B Receptor Agents into Mesencephalic Cuneiformis Nucleus (Cnf) of Rat

Bakhshesh M^{1*}, Rezvanipour M², Sheibani V³.

Abstract

Introduction: There are several evidences which prove cuneiformis nucleus involvement in nociception and possible role of opioid modulation of pain transmission from periphery to the cord and other higher nervous centers was the most interest of this study to be justified.

Material & methods: In the present study, the effect of intra cuneiformis microinjection of GABAB receptor agonist (-(-) Baclofen) and antagonists (CGP35348) on morphine-induced antinociception in rat were investigated.

Findings: Microinjection of morphine (10µg/0.5µl/rat) or different doses of Baclofen (.25, .5 & 1µg per rat) had antinociception in the both, first and second phases of the formalin test. The response induced by morphine or baclofen in both phases was reduced by CGP35348. The response induced by combination of microinjection of baclofen (1µg per rat) and intraperitoneal (i.p) injection of naloxone in both phases was reduced in comparison to saline or baclofen (1µg per rat) alone.

Microinjection of CGP35348 alone produced antinociception in the first phase of the formalin test. Morphine in combination with different doses of baclofen did not elicit potentialities in both phases, while CGP35348 in acute phase elicited potentialities.

Conclusion: It may be concluded that Cnf GABA_B receptor via opioid receptor, induced antinociception in the formalin test.

Key words: Naloxone, GABA_B receptor, Cuneiformis nucleus, Nociception.

1) Dept of Physiology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences

2) Dept of Physiology, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences

3) Research Center Nervous Sciences, Kerman University of Medical Sciences